

ГР. РУСЕ

Състоянието на въздуха е измервано на четири пункта. Анализирани са 1170 проби на атмосферен въздух. Въз основа на проведените изследвания може да се направят следните изводи за състоянието на въздуха по замърсители:

ПРАХ

- средните концентрации са без подчертана тенденция и се изменят от стойности под ПДК до 1.8 пъти над ПДК,
- максималните средноденонощни са без изразена тенденция и се изменят от стойности под ПДК до 2.9 пъти над ПДК (XII, бул.Скобелев),
- процентът на пробите над ПДК за IV тримесечие на 1989 г. е 62.1%.

СЕРЕН ДВУОКИС - тенденция към слабо понижение на концентрациите спрямо 1988 г.:

- средните концентрации са с тенденция на повишаване и се изменят от стойности под ПДК до 2.2 пъти над ПДК,
- максималните средноденонощни са с тенденция на повишаване от стойности под ПДК до 3.1 пъти над ПДК,
- процентът на пробите над ПДК за IV тримесечие на 1989 г. е 35.7%.

СЯРОВОДОСРОД - тенденция към понижение на концентрациите спрямо 1988 г.:

- средните концентрации са под ПДК,
- максималните средноденонощни са без подчертана тенденция и се изменят от стойности под ПДК до 1.6 пъти над ПДК (обществ. кв. Дружба), а измерените концентрации на другите пунктове са под ПДК,
- АЗОТНИ ОКИСИ - тенденция към понижение на концентрациите спрямо 1988 г.:

- средните концентрации са под ПДК, с изключение на месец XII, пункт "кв.Здравец" (1.2 пъти над ПДК),
- максималните средноденонощни са без изразена тенденция и се изменят от стойности под ПДК до 1.8 пъти над ПДК (XII, кв.Здравец)
- процентът на пробите над ПДК за IV тримесечие на 1989 г. е 17.0%.

СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РАЙОНА НА ГР. СВИЩОВ

Състоянието на въздуха е измервано на три пункта. Анализирани са 600 проби на атмосферен въздух. Въз основа на проведените изследвания може да се направят следните изводи за състоянието на въздуха по замърсители:

- ПРАХ - наблюдава се тенденция към намаляване на концентрациите спрямо 1988 г.:
- средните концентрации са без подчертана тенденция и се изменят от 2.9 до 4.7 пъти над ПДК (XII, №2, В.Търново),
- максималните средноденонощни са без подчертана тенденция и се изменят от 3.3 до 5.8 пъти над ПДК (XII, №2, В.Търново),
- процентът на пробите над ПДК за IV тримесечие на 1989 г. е 100 %.

